

NE TAKO ČESTI NEŽELJENI EFEKTI (1:1000 pacijenta) I KOMPLIKACIJE ANESTEZIJE

- Oštećenje zuba (nije često, ali se može desiti ukoliko Vaše dijete ima mliječne zube koji se klata, mala usta, malu vilicu ili ukoliko se ne može dovoljno zabaciti vrat, obavezno je da prije operativnog zahvata dijete skine mobilne zubne proteze).
- Upala pluća.
- Bol u mišićima (ovo neželjeno dejstvo se može javiti nakon opšte anestezije, na zahtijeva liječenje).
- Problemi sa disanjem.
- Pogoršanje postojećeg zdravstvenog problema (komorbiditeti).

RIJETKI I VEOMA RIJETKI NEŽELJENI EFEKTI (1:10000 ili 1:1000000 pacijenata) I KOMPLIKACIJE ANESTEZIJE

- Ozbiljne alergijske reakcije na lijekove koji se koriste u anesteziji se vrlo brzo primjete i odmah liječe. Međutim, vrlo rijetko mogu dovesti i do smrti, čak i kod zdravih ljudi. Zato je važno dati podatak da li ste Vi, Vaše dijete ili članovi Vaše porodice nekada imali ozbiljnu reakciju na lijekove, koja je morala da se liječi u nekoj zdravstvenoj ustanovi.
- Oštećenje nerava (može da se javi u toku regionalne anestezije ili zbog pritiska na nerv tokom ležanja na operacionom stolu). Ova komplikacija je najčešće prolazna, ali u nekim slučajevima je i trajna.
- Smrt (smrt kao posljedica primjene anestezije je veoma rijetka – oko pet slučajeva na milion anestezija).

Anesteziju vode dobro obučeni i iskusni anesteziolozi, pa je rizik da se nešto loše desi minimalan.

Ukoliko i poslije čitanja ovog obavještenja budete imali pitanja u vezi anestezije, budite slobodni da ih postavite anesteziologu.

Anesteziolog će se uvijek truditi da prije uvođenja u anesteziju, Vaše dijete bude u najboljem mogućem stanju.

Oba roditelja moraju dati svoj pisani pristanak za uvođenje djeteta u anesteziju.

MI BRINEMO O VAŠEM ZDRAVLJU

Klinika za anesteziju i reanimaciju



OSNOVNE INFORMACIJE RODITELJU/STARATELJU O ANESTEZIJI/ANALGOSEDACIJI MALOLJETNOG DJETETA

Ovaj informativni letak ima za cilj da Vam da osnovne informacije u vezi anestezije.

Anesteziolog je doktor koji je specijalno obučen za primjenu anestezije, otklanjanje bola, brigu o teškim pacijentima i reanimaciju (oživljavanje) pacijenta.

Anesteziolog Vašeg djeteta je odgovoran za pripremu djeteta za operativni zahvat, samu primjenu anestezije, dobrobit i bezbjednost Vašeg djeteta prije, za vrijeme i neposredno poslije anestezije i operacije, kao i primjenu transfuzije krvi i krvnih derivata ukoliko je potrebno.

VRSTE ANESTEZIJE

- **Opšta anestezija** - kontrolisano stanje bez svijesti, tokom kojeg Vaše dijete ne osjeća ništa, niti se bilo čega sjeća.
- **Regionalna anestezija** - u ovoj vrsti anestezije, anesteziolog daje lijek u okolini nerava, da bi obezbolio regiju tijela Vašeg djeteta na kojoj će se vršiti operacija. Najčešće vrste regionalne anestezije su periferni blokovi, spinalna i epiduralna anestezija (kaudalni blok kod djece). U toku regionalne anestezije po davanju lijeka, dijete može osjetiti trnjenje ili toplinu, što je znak da anestezija počinje da djeluje. Cilj anestezije je da Vaše dijete ne osjeća bol. Međutim, ponekad se može osjetiti dodir ili pritisak na mjestu operacije, što je potpuno normalno. Operacija (operativni zahvat) će početi samo onda kada je anesteziolog siguran da Vaše dijete ne osjeća bol.
- **Analgesedacija** - sedacija je upotreba male količine lijekova koji se inače koriste u opštoj anesteziji pri čemu dolazi do gubitka svijesti, ali ne i do prestanka disanja. Koristi se tokom dijagnostičkih i kratkih terapijskih procedura, koje su neprijatne i/ili bolne (npr. gastroskopija, kolonoskopija, audiogram, biopsije ...). Kao dio pripreme za anesteziju Vašeg djeteta, anesteziolog prilikom razgovora s Vama (nakon pročitane gore navedenog postupka) može postaviti neka pitanja u vezi sa zdravljem Vašeg djeteta i u vezi života, a koja su od interesa za anesteziju. Vrlo je važno da iskreno, tačno i što je preciznije moguće odgovorite na ova pitanja, neophodno je da se istaknu posebni problemi koje bi dijete moglo da ima sa svim aspektima pripreme i uvođenja u anesteziju, kako bi se dijete adekvatno pripremilo za istu i to ne samo od strane anesteziologa, već i drugih ljekara specijalista po potrebi, kao i od strane roditelja.

TRANSFUZIJA KRV

Postoji mogućnost da tokom pojedinih operacija dođe do gubitaka krvi kod Vašeg djeteta. U tom slučaju, anesteziolog će morati da razmotri primjenu transfuzije krvi. Ponekad ova potreba će se desiti neočekivano. Vi imate pravo da odbijete transfuziju krvi, ali to morate tačno da naglasite hirurгу i anesteziologu prije operacije.

ZAŠTO ANESTEZIOLOG ODLAŽE OPERACIJU VAŠEG DJETETA?

Ponekad anesteziolog će otkriti nešto u vezi sa zdravljem Vašeg djeteta što bi moglo da dovede dijete u opasnost tokom operacije i anestezije. Tada bi trebalo odložiti operaciju Vašeg djeteta dok se problem ne ispita ili popravi.

RIZICI U TOKU ANESTEZIJE

Svaka procedura u medicini pored dobrobiti za pacijenta, nosi sa sobom i neke rizike.

Rizik ne može biti potpuno otklonjen uprkos dobroj obuci, modernoj opremi i savremenim lijekovima.

Rizik za Vaše dijete kao pojedinca će zavisi od drugih bolesti koje Vaše dijete ima, ličnih karakteristika, npr. urođene anomalije, gojaznost, pušenje, vrste operacije.

NEŽELJENI EFEKTI I KOMPLIKACIJE ANESTEZIJE

Neželjeni efekti i komplikacije anestezije su neočekivani događaji u toku anestezije, npr. alergija na lijek, drugi efekti lijeka ili medicinske procedure. Nekada se ne mogu izbjeći, neki ne traju dugo i spontano prolaze, a neke treba rješavati.

VRLO ČESTI NEŽELJENI EFEKTI (1:10 pacijenata) I ČESTI (1:100 pacijenata) I KOMPLIKACIJE ANESTEZIJE

- Muka i povraćanje (neki lijekovi, neki operativni zahvati i neke karakteristike samog pacijenta uzrokuju da poslije operativnog zahvata se javi osjećaj muke ili povraćanje).
- Bol u grlu (ukoliko je dijete tokom operativnog zahvata imalo tubus u dušniku ili cjevčicu u želucu može osjećati bol ili grebanje u grlu).
- Vrtoglavica i nesvjestica (poslije određenih operativnih zahvata, krvni pritisak kod Vašeg djeteta može biti niži i dovesti do osjećaja nesvjestice).
- Glavobolja (postoji mnogo mogućih uzroka glavobolje, uključujući anesteziju, operativni zahvat, nervozu).
- Problemi sa mokraćnom bešikom (nekada zbog vrste operativnog zahvata se stavlja urinarni kateter koji može izazvati neprijatan osjećaj).
- Povreda usana ili jezika (može se javiti u slučaju otežane intubacije).
- Svrab (ovo je neželjeni efekat nekih lijekova, ali može biti i znak alergije).
- Bol u nekim dijelovima tijela (iako se o udobnosti pacijenta jako vodi računa, neki pacijenti mogu osjetiti nelagodnost i bol poslije operacije).
- Bol tokom davanja lijeka (neki lijekovi koji se daju u mišić ili venu mogu izazvati neprijatnosti na mjestu davanja).
- Modrice ili crvenilo kože (može se javiti na mjestu davanja injekcije ili plasiranja i.v. kanile).
- Drhtanje (može se javiti prilikom dužeg boravka u operacionoj sali ili kao posljedica davanja nekih lijekova).